

Mäusebussard

(*Buteo buteo*)

Der häufigste einheimische Greifvogel. Fast alle haben ihn schon an Autobahnen und Landstraßen, auf einer Warte sitzend oder fliegend, gesehen. Trotzdem kommt es häufig zu Verwechslungen mit anderen Greifvögeln, weil die Mäusebussarde eine Vielzahl verschiedener Farbschattierungen (von fast weiß bis dunkelbraun) aufweisen und auch die Größe regional unterschiedlich sein kann. In Schleswig-Holstein ist er das ganze Jahr anzutreffen. Während des Winters sogar in größeren Stückzahlen, weil die skandinavischen Vögel häufig hier überwintern. Im Frühjahr, während der Balz, kreisen die Paare oft stundenlang am Himmel.



Gewicht: ♂ 750g ♀ 1000g
Lebensalter: ca. 25 Jahre
Nahrung: Kleinnager, Regenwürmer, Insekten

Fortpflanzung

Nest: umfangreicher Bau aus Stöcken, kleinen Zweigen und Halmen; mit unterschiedlichen grünen Materialien ausgelegt, die ständig erneuert werden.
Gelege: 2-3 Eier; Beginn Ende März bis Ende Mai
Brutdauer: 33-35 Tage
Nestlingsdauer: Nesthocker; werden zuerst nur vom ♀ gehudert und gefüttert, ♂ beschafft die Beute; später jagen beide Eltern, aber nur ♀ füttert; flügge mit 40-49 Tagen.